






مراقبت فوری مورد نیاز است.



همه آنژیوادم‌ها آلرژیک نیستند.



آنژیوادم ارثی (HAE) با تورم مکرر پوستی، درد شکمی و یا انسداد راه‌های هوایی به دلیل آنژیوادم تظاهر می‌یابد. آنژیوادم ارثی اغلب به اشتباه آنژیوادم آلرژیک یا آنژیوادم به واسطه هیستامین تشخیص داده می‌شود.


تورم آنژیوادم به دلیل تولید بیش از حد برادی کینین است که معمولاً به دلیل عملکرد کم پروتئین مهارکننده C1 می‌باشد.

داروهای درمان کننده آلرژی (آنتی‌هیستامین‌ها، کورتیکواستروئیدها و اپی‌نفرین) در درمان آنژیوادم ناشی از آنژیوادم ارثی موثر نمی‌باشد. تورم راه‌های هوایی خطرناک است و ممکن است به دلیل کمبود شدید اکسیژن (خفگی) منجر به مرگ شود.

درمان آنژیوادم ارثی (HAE)

- داروهای تایید شده برای درمان حملات شدید آنژیوادم ارثی (HAE) (موقعی که در دسترس باشند).
- پلاسما منجمد تازه (FFP) (زمانی که درمان‌های مورد تایید در دسترس نباشند).

تورم راه‌های هوایی خطرناک است و در صورتیکه سریعاً درمان نشود، می‌تواند منجر به مرگ شود.



نرخ مرگ و میر: 30 %

علائم آنژیوادم ارثی (HAE)

○ صورت

- احساس کشیدگی در پوست
- تورم صورت و یا لب‌ها
- راش اریتماتوز بدون خارش در 25% بیماران

○ شکم

- استفراغ
- اسهال
- دردهای شبیه کولیک، اغلب شدید
- حالت تهوع

○ حنجره و حلق

- مشکل در بلع
- گرفتگی صدا
- تغییر صدا
- در موارد شدید، خفگی

○ اندام‌ها

- احساس کشیدگی در پوست
- تورم
- محدودیت حرکت
- راش اریتماتوز بدون خارش در 25% بیماران



HAEi
HAE International

سازمان مردم نهاد
مؤسسه حمایت از بیماران
مبتلا به نقص سیستم ایمنی
شماره ثبت: ۴۵۳۰۵



مرکز تحقیقات ایمنولوژی، آسم و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران